

ACTILER 38 WG

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

BOSCALID 25.20% + PYRACLOSTROBIN 12.80%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	CARBOXAMIDA, ESTROBILURINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC:	Pyraclostrobin: 11 Boscalid: 7

MODO DE ACCIÓN

ACTILER® 38 WG es un fungicida sistémico de efecto preventivo, curativo y erradicante de acción prolongada para el control de un amplio rango de enfermedades compuesto por dos ingredientes activos, Boscalid y Pyraclostrobin. Boscalid actúa inhibiendo la germinación de esporas, impide el crecimiento micelial y la esporulación; Pyraclostrobin presenta acción translaminar afectando la producción de energía de las células del hongo en dos sitios distintos a nivel mitocondrial que conlleva al daño de sus funciones vitales. Como resultado, **ACTILER® 38 WG** actúa de forma eficiente al traslocarse de modo translaminar y vía corriente transpiratoria en dirección acropétala hacia el extremo y bordes de la hoja. Reduce el riesgo de resistencia cruzada e impide el desarrollo del hongo desde la germinación de la espора hasta la formación del apresorio.

USOS PARA HONDURAS:

USOS		
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Arveja <i>Pisum sativum</i>	<i>Rhizoctonia solani</i> Mildiu polvoso <i>Erysiphe polygoni</i> Mancha negra <i>Ascochyta pisi</i>	0.80 kg/ha (0.56 kg/mz)
Brócoli <i>Brassica oleraceae</i> var. <i>italica</i>	<i>Phoma lingam</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Alternaria brassicae</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	
Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Roya <i>Uromyces phaseoli</i>	
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	Roya <i>Puccinia arachidis</i> Viruela <i>Cercospora arachidicola</i>	
Papaya <i>Carica papaya</i>	Mancha negra <i>Cercospora papayae</i>	
Fresa <i>Fragria vesca</i>	Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i>	
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile <i>Capsicum annum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	

Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Tizón foliar <i>Alternaria dauci</i>	

PRESENTACIONES

1kg, 200g

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.