

Composición:

200 gramos de **Flutriafol** y 200 gramos de **Azoxystrobin** de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Características físicas y químicas:

Familia química: Estrobirulina + Triazol

Clasificación toxicológica: IV

Usos: Fungicida

Modo de acción:

TANDEM® 40 SC es un fungicida de amplio espectro con efecto preventivo curativo y erradicante. Posee acción por contacto, translaminar y sistémica. Azoxystrobin impide la germinación de esporas y la respiración mitocondrial de los hongos. Flutriafol inhibe la síntesis de ergosterol, que impide el crecimiento del hongo. TANDEM® 40 SC actúa sobre la cadena de transferencia de electrones entre los citocromos b y c1 bloqueando la síntesis de ATP.

Usos:

Cultivo		Enfermedad		Dosis
Arroz	<i>Oryza sativa</i>	Añublo de la vaina Pudrición de la vaina Complejo manchado de grano Alternaria Fusarium Curvularia	<i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sarocladium oryzae</i> <i>Helminthosporium Oryzae</i> , <i>Cercospora Oryzae</i> , <i>Sarocladiym oryzae</i> , <i>Bipolaris orizae</i> <i>Alternaria spp</i> <i>Fusarium spp</i> <i>Curvularia spp</i>	0.3 - 0.5 L/ha (0.21 - 0.35 L/mz)
Frijol Arveja Ejote francés Soya Maní	<i>Phaseolus vulgaris</i> <i>Pisum sativum</i> <i>Phaseolus vulgaris</i> <i>Glycine max</i> <i>Arachis hypogaea</i>	Roya del frijol Roya del maní Roya suramericana	<i>Uromyces phaseoli</i> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <i>Isariopsis griseola</i> <i>Puccinia arachidis</i> <i>Phakopsora meibomiaae</i>	0.4 - 0.5 L/ha (0.28 - 0.35 L/mz)
Maíz	<i>Zea maydis</i>	Quemado de la hoja Mancha de asfalto	<i>Helminthosporium maydis</i> <i>Phyllachora maydis</i>	0.3 - 0.5 L/ha (0.21 - 0.35 L/mz)

Tomate Chile pimiento o dulce Berenjena	<i>Solanum lycopersicum Capsicum annuum Solanum melongena</i>	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2 - 0.35 L/ha (0.22- 0.25L/mz)
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.75 L/ha (0.52 L/mz)
Café	<i>Coffea arabica</i>	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.6 L/ha (0.42L/mz)
Aguacate Durazno Ciruela	<i>Persea americana Prunus pérsica Prunus domestica</i>	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloesporioides</i>	0.5 - 0.75 L/ha (0.35- 0.52L/mz)
Plátano	<i>Musa x paradisiaca</i>	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.4L/Ha (0.28L/mz)
Naranja Limón Mandarina	<i>Citrus sinensis Citrus limón Citrus reticulata</i>	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloesporoides</i>	0.5 - 0.75 L/ha (0.35- 0.52L/mz)

Presentaciones:

500 ml, 1 Lt, 5 Lt

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.

Versión 01