

TOTEM 72 SL

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

2,4 – D 720g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	FENOXI
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 3
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	4

MODO DE ACCIÓN

TOTEM® 72 SL es un herbicida hormonal selectivo post-emergente para el control de malezas de hoja ancha, en los cultivos indicados, excepto en el cultivo de café, para el que la aplicación debe de realizarse dirigida a las malezas, verificando que el producto no toque el follaje ni el tronco del cafeto. Actúa por translocación vía floema hacia la zona de mayor actividad metabólica, inhibiendo el crecimiento de la maleza.

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Escobillo <i>Sida spp.</i> Tomatillo <i>Solanum americanum</i> Bledo <i>Amaranthus spp</i>	1.0 – 1.5 L/ha (0.7 – 1.0 L/mz)	La aplicación debe efectuarse después del macollamiento pero antes que se inicie la floración.
Maíz <i>Zea mays</i>	Lechuguilla <i>Sonchus oleraceus</i> Mostaza <i>Brassica campestris</i> Flor amarilla <i>Bidens pilosa</i> Siempre viva <i>Commelina diffusa</i> Rabanillo <i>Raphanus</i>	1.0 – 1.75 L/ha (0.7 – 1.2 L/mz)	No se debe efectuar aplicación postemergente en suelos arenosos cuando el maíz tiene una altura de 24 cm, ni tampoco cuando se cultive para la producción de semilla híbrida.
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	<i>raphanistrum</i> Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i>	2.0 – 4.0 L/ha (1.4 – 2.8 L/mz)	Aplicar inmediatamente después de plantarse o antes que retoñen los brotes.
		1.5 – 3.0 L/ha (1.0 – 2.1 L/mz)	Después de que la caña retoñe, desde una altura de 30cm, hasta que se cierran las hileras.
Café <i>Coffea arabica</i>		1.25 – 2.0 L/ha (0.9 – 1.4 L/mz)	La aplicación no debe tocar el follaje ni el tronco del cafeto.
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>		0.5 – 1.0 L/ha (0.3 – 0.7 L/mz)	Aplicar cuando la planta tenga una altura de 15 cm.

Pastizales		1.25 – 2.0 L/ha (0.9 – 1.4 L/mz)	Las leguminosas forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida especialmente si se aplica cuando la temperatura es elevada. No permitir que los animales se alimenten del pasto tratado durante 3 semanas después del tratamiento.
------------	--	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIONES

1 L, 3.5 L, 18 L, 200 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.