

# TUITEN 20 SC

## INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

SPIRODICLOFEN, ABAMECTIN

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ÁCIDO TETRÓNICO, AVERMECTINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Insecticida
GRUPO IRAC:	Abamectin: 6 Spirodiclofen: 23

### MODO DE ACCIÓN

**TUITEN® 20 SC** es un acaricida que combina la acción traslaminar de la Abamectin dentro de la hoja y la acción de contacto del Spirodiclofen controlando todos los estados de desarrollo de los ácaros. La mezcla de ambos principios activos de acción inmediata y larga duración, permite mantener a las poblaciones de las plagas en niveles que no ocasionen daños a los cultivos.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

##### HONDURAS:

USOS		
CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Cítricos <i>Citrus sp.</i>	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i> Minador de la hoja <i>Phyllocnistis citrella</i> Ácaros <i>Phyllocoptutra oleivora</i>	0.20 – 0.25L/ha (0.14 – 0.17L/mz)
Aguacate <i>Persea americana</i>	Ácaro café <i>Oligonychus punicae</i>	1.0 – 1.2L/ha (0.70 – 0.84L/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i> Minador de la hoja <i>Liriomiza sativae</i>	0.30 – 0.40L/ha (0.21 – 0.28L/mz)

### PRESENTACIONES

1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.